

## Ein neuer *Dyschirius* und zwei neue Käfer- Aberrationen.

Von Obersanitätsrat Dr. A. Fleischer in Brünn.

### *Dyschirius Lgoeckii* n. sp.

So groß wie ein mittelgroßer *nitidus*, auch von ähnlichem Habitus, nur auf den Flügeldecken etwas abgeflacht; Oberseite hellkupfrig, Fühler und Beine braunrot. Klypeus etwas erhöht, mit geradem Vorderrande; in der Mitte des Hinterrandes setzt er sich als länglicher abgerundeter Wulst gegen die Stirn fort, von welcher er undeutlich abgegrenzt erscheint. Der Apikaldorn der Vorderschienen sowie bei den Arten aus der Gruppe des *nitidus*, kräftig und lang; das vordere und auch das hintere Zähnchen auf der Außenseite der Vorderschienen klein, nur als ein dreieckiges stumpfes Höckerehen vortretend. Halsschild etwas hinter der Mitte am breitesten, nach rückwärts etwas mehr verengt als nach vorn. Die Basis der Flügeldecken leicht ausgebuchtet und von den Schultern gegen die Mitte zu gerandet. Flügeldecken etwa so breit wie bei *nitidus*, sehr grob, punktiert-gestreift, die großen Punkte quer, so breit, daß die Zwischenräume nur als schmale Rippen vortreten. Der erste Streifen ist an der Basis vertieft und mündet in ein deutliches Porengrübchen. Die Flügeldeckenspitze ist breit abgeflacht; der siebente und achte Streifen biegen vor der Spitze in flachem Bogen gegen die Naht ab, wo sie sich mit dem ersten Streifen vereinigen.

Von den mir bekannten *Dyschirius*-Arten hat der nur kaum halb so große *D. exaratus* Schaum eine ähnliche grobe Skulptur aufzuweisen. Long. 4·5 mm. — Taschkent (Dr. Lgoeck).

### *Dyschirius nitidus* a. *niger* m.

Ganz schwarze *Dyschirius nitidus* oder schwarze mit nur schwachem Metallschimmer, sammelte Herr Dr. Lgoeck in Mehrzahl bei Kiew in Rußland. Die Benennung derartiger Koloritaberrationen, welche bei der Determination beirren können, halte ich für berechtigt.

### *Sclerophaedon carniolicus* a. *violaceus* m.

Der Käfer ganz violett blau.

Diese Koloritaberration wurde vom Herrn Lehrer Schaaf in Iggelbach-Rheinpfalz auf dem Wolfsberge in Kärnten gleichzeitig mit der Stammform gefunden. Von derselben Lokalität habe ich auch ganz schwarze Individuen oder schwarze mit bläulichem Schimmer: a. *obscurus* Weise gesehen.